

ANKAHED Zona Aşısı Seferberliği: Sahadan Gerçek Veriler ve Geri Bildirim Raporu

Yaklaşık 500 meslektaşımız ve yakınının tecrübelerine dayanan klinik etkililik, yan etki profili ve gelecek vizyonu analizi.



Geniř Çaplı Bir Ařılama Hareketi ve Yüksek Temsil Gücüne Sahip Veri Seti



~500

Uygulanan Aşı Dozu



%60

Geri Bildirim Sağlayan
Katılımcı Oranı

Anket aracılığıyla ulařılan ve tecrübeleri
analiz edilen kesitin büyüklüğü.



%100

Bilimsel Veri
Kullanım Onayı

Katılımcıların tamamı verilerinin
bilimsel analizi için onay vermiştir.

Katılımcı Profili: Meslektaşlarımız ve Yüksek Risk Grubundaki Yakınları



Birinci Basamak Sağlık Çalışanları

Birinci basamak sağlık hizmeti sunucuları, mesleki maruziyet riskine karşı koruma altına alındı.



Yüksek Risk Grubundaki Yakınlar



İmmünsüpresif Vakalar


"Böbrek nakilli annem için talep ettim..."



Geçmiş Öykü

"Daha önceden Zona geçiren hastalar ve yakınlar..."

Katılımcıların Neredeyse Tamamı Aşı Seferberliğinden Memnun Kaldı



Klinik koruyuculuk beklentisi,
katılımcılar nezdinde büyük bir güven ve memnuniyet oluşturdu.

Çekincelerin Analizi: Memnuniyetsizlik Yaratan Temel Bariyerler



Aşının Maliyeti

Daha geniş kitlelere ulaşılmasının önündeki en belirgin engel olarak kişisel bütçe zorlanması raporlanmıştır.



Aşının Yeni Oluşu

Klinik pratikte yeni kullanıma giren immünolojik ajanlara karşı duyulan doğal hekim/hasta çekincesi.

Önemli Çıkarım: Bu bariyerlere rağmen ulaşılan yüksek aşılama oranı (~500 doz), ANKAHEP'in kurumsal güvenilirliğinin maliyet ve yenilik endişelerini aştığını göstermektedir.

İstenmeyen Etki Profili: Beklenen İmmünolojik Yanıtlar

Hayır

Katılımcıların önemli bir kısmı aşı sonrası hiçbir istenmeyen etki bildirmedi.




Evet

Görülen etkiler; aşı mekanizmasının doğal bir sonucu olan, beklenen ve geçici lokal/sistemik immün yanıtlardan ibaretti.



Semptom ve Süreç Haritası: Yan Etkiler 72 Saat İçinde Sönümleniyor



“1. Dozdan sonra 48 saat devam eden şiddetli kas ağrılarım oldu.”

Sahadan Stratejik Bir Öneri: “Cuma Günü Planlaması”




“

“...aşıyı çalışan hastalara Cuma günü yaptırmalarını öneriyorum.”

Klinik Rasyonel: 48-72 saat sürebilen şiddetli halsizlik, kas ağrısı ve ateş gibi beklenen reaksiyonların mesai saatlerine denk gelmemesi.

Sonuç: Hafta sonunun ‘dinlenme ve immün yanıtı atlatma’ penceresi olarak kullanılması, sağlık çalışanları için iş gücü kaybını önler.

Geniřletilmiř Koruyuculuk: Demans ve Miyokard Enfarktüsü Farkındalıęı



Anket verileri; ařının nöropatik komplikasyonlar haricinde, Demans ve Miyokard Enfarktüsüne karřı sistemik koruyucu rolü hakkında hekimler arasında karmařık (farklılařan) bir farkındalık düzeyi olduęunu göstermektedir.

Eęitim Fırsatı

Hekim popölasyonunda dahi farkındalıęın dalgalı olması, ANKAHED için **gelecekteki bilimsel toplantılarda** bu konunun (Zona'nın sistemik inflamatuvar yükü) iřlenmesi adına deęerli bir veri sunmaktadır.

Vaka Bildirimi: Gerçek Hayat Etkinliği ve “Hafifletilmiş Seyir”


“

Aşı sonrasında yakın zamanda Zona benzeri bir sendrom geçirdim ama yanma, ağrı ve yayılma olmadı; tedavisiz iyileşti. Net olmamakla birlikte o dönemde... aşının koruyuculuğu nedeniyle yayılmadığını düşünmekteyim.”



Klinik Çıkarım: Bu vaka, aşılamanın temel değer önerisini doğrulamaktadır. Aşılanan bireylerde enfeksiyon gelişse dahi, postherpetik nevralji ve yayılımın engellenmesi müdahalenin gücünü kanıtlar niteliktedir.

Gelecek Vizyonu: Sahadan Yükselen Talepler ve Sonuç



Bu proje, meslektaşlarımızın koruyucu hekimlik inancının bir kanıtıdır. Katılımcımızın sözleriyle: “Emekleriniz çok kıymetli, ilk fırsatta yine birlikte olmak dileğiyle...”